КОМНАТНЫЕ МИРТОВЫЕ

Среди множества видов миртовых есть очень красиво и необычно цветущие растения (хамелациум, триптомена, метросидерос, каллистемон), декоративнолиственные с вариегатной листвой (мирт, метросидерос), большую популярность сейчас приобрели и плодовые миртовые растения (евгении, сизигиумы, псидиумы). Цветение миртовых обычно длится с весны до лета, к осени созревают плоды. В хороших условиях цветение может начинаться уже в конце зимы.

В листьях всех представителей семейства миртовых содержатся эфирные масла. Благодаря фитонцидным свойствам они подавляют патогенную микрофлору и благотворно влияют на качество воздуха в помещении. Самыми высокими фитонцидными свойствами обладают эвкалипт, мелалеука и сам мирт. Эти растения очень полезно иметь в доме, особенно в спальне или детской комнате.

МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ

На просвет миртового листа хорошо видны эфирные железки, при растирании распространяющие приятный аромат. Само название растения (от греческого myrtos или более древнего myron) означает «благовоние». Особенно прекрасно миртовое растение в период цветения, усыпанное некрупными белокремовыми пятилепестными цветками с множеством тычинок, обладающими пряным ароматом. После цветения, которое длится с весны до середины лета, завязываются округлые темно-синие или черные ягоды (редко белые или розовые).



В известном водевиле «Соломенная шляпка» папаша невесты, почетный член общества садоводов Сиракуз, желает собственноручно поставить в комнату дочери миртовое дерево. Автор водевиля Эжен Лабиш увековечил французскую традицию дарить миртовое дерево молодоженам. А в Англии веточки мирта до сих пор вплетают в венок невесты. Эти традиции восходят к Древней Греции, когда существовали специальные отделы «мирринэ», где продавали благовонные миртовые венки, считавшиеся знаком власти и почитания, для всех религиозных и общественных церемоний.



Мирт обыкновенный



Мирт *Тарентина*

В продажу обычно поступают стриженые штамбовые деревца карликового мелколистного сорта *Микрофилла* (Mycrophylla). В коллекциях также встречаются интересные сорта *Тарентина* (Tarentina) с мелкой густой листвой и обильным цветением, *Боэтика* (Boetica) - медленнорастущий сорт с закрученным стволиком, крупными, до 7 см, ланцетными заостренными листьями, более крупными цветками и продолговатыми синими ягодами. Сорт *Вариегата* (Variegata) имеет неровное кремовое окаймление листа, часто охватывающее почти весь лист, а сорт *Флоре Плено* (Flore Pleno) - привлекательные махровые цветки.

Не все знают, что бутоны и цветки растения съедобны и могут использоваться в цветочной кухне, для экзотического украшения салатов. На Ближнем Востоке из свежих ягод готовят оригинальный кислый напиток, а сушеные используют в качестве приправы к мясу. На Сицилии местной достопримечательностью являются ароматные ликеры, настоянные на ягодах или листьях мирта.



Мирт *Боэтика*



Мирт *Вариегата*

СИЗИГИУМ

Этот род самый многочисленный среди миртовых, насчитывает до 1500 растений. Его название (от греческого syzygos - «парный») указывает на супротивное расположение листвы. Это великолепные растения с глянцевой кожистой листвой без запаха, но при этом содержащей эфирные масла. Цветки у некоторых видов достигают 10 см в диаметре, белые, розовые или сиреневые, с множеством тычинок, ароматные и медоносные. Плоды многих видов съедобны.

Самый распространенный в комнатных условиях вид - **сизигиум метельчатый** (Syzygium paniculatum), также известный под устаревшим названием **евгения миртолистная** (Eugenia myrtifolia). Существует пестролистный сорт с белоокаймленными листьями.

Весной - в начале лета растение покрывается метельчатыми соцветиями ароматных белых цветков, в которых четыре лепестка полностью скрыты многочисленными лучами тычинок. К осени созревают крупные эллипсоидные ягоды до 2 см в диаметре, пурпурного или фиолетового цвета. За эти съедобные плоды растение называют также «пурпурной вишней», хотя они кисловаты и суховаты, словно жуешь пенопласт. Замечено, что их полезно пожевать при болезнях горла, за что сизигиум метельчатый называют в обиходе «ангиновым деревом».

Сизигиум ямбоз (Syzygium jambos) - *самый декоративный* из родственных видов благодаря красным верхушкам, очень длинной блестящей листве, прекрасным (*до 10 см диаметром*) «пушистым» цветкам, включающим до 300 тычинок. В странах Юго-Восточной Азии - это плодовое растение под названием «малабарская слива» или «розовое яблоко». Даже в комнатных условиях оно способно цвести до 3 раз в год и давать небольшой урожай довольно крупных и слегка хрустящих ягод со смешанным вкусом яблока и арбуза и легким розовым ароматом.



Сизигиум метельчатый



Сизигиум ямбоз, или малабарская слива

Сизигиум Смита (Syzygium smithii) на наш цветочный рынок поступает под устаревшим названием **акмена Смита,** обычно в виде штамбового деревца. Отличается очень нарядными кремовыми цветками, состоящими из множества тычинок. Поражает необычными блестящими фиолетовыми плодами. Они съедобны, но по вкусовым качествам значительно уступают плодам ямбоза.

ЛЮМА

Люма, или лума, по месту происхождения называется еще чилийским миртом. **Люма остроконечная** (Luma apiculata) - многоствольное растение с оригинальной отслаивающейся оранжево-коричневой корой, обладающей мылящими свойствами. Листья некрупные, с приятным терпким запахом при растирании. Цветет все лето белыми ароматными цветками, расположенными одиночно или по 3-5. Осенью образует темно-фиолетовые ягоды, внешне напоминающие черничные, со сладковатым вкусом, хотя иногда довольно сухие. Растение хорошо формируется в стиле бонсай, но в комнатной культуре встречается очень редко.


Люма остроконечная

КАЛЛИСТЕМОН, ИЛИ КРАСИВОТЫЧИННИК

Каллистемоны очень близки к мелалеукам. Это одни из красивейших деревьев и кустарников, которые можно часто видеть в теплых странах, особенно **каллистемон ланцетный** (Callistemon lanceolata). Наиболее доступны **каллистемон лимонный** (Callistemon citrinus), **каллистемон прутовидный** (Callistemon viminalis) и их сорта и гибриды. Первый назван за лимонный аромат листьев. Они жесткие, до 9 см длиной. Цветет в летний период, образуя верхушечные соцветия с длинными *бордово-красными тычинками*, напоминающие бутылочные ершики. Отцветшие соцветия не обрезают - на их месте остаются сидящие на побегах кубковидные семенные коробочки.


Каллистемон


Мелалеука прейса

МЕЛАЛЕУКА

Этот род, объединяющий порядка 170 растений, наиболее известен благодаря **мелалеуке очереднолистной** (Melaleuca alternifolia). Именно из ее листьев получают знаменитое масло чайного дерева.

В комнатной культуре лучше всего чувствуют себя виды с мелкой листвой, например, **мелалеука диосмолистная** (Melaleuca diosmifolia). Ее спирально расположенные продолговатые листья при растирании пахнут камфорой. Цветки быстро теряют лепестки, оставляя только пучки длинных зеленоватых тычинок, напоминающих расположенные на концах побегов ершики. Цветет все лето, завязывает осенью сухие шаровидные многосемянные коробочки.


Метросидерос Томаса

МЕТРОСИДЕРОС

Особенностью метросидеросов являются цветки без венчика, с пучком длинных тычинок, окрашенных в красный, оранжевый, лососевый, желтый или розовый цвет. Среди них есть кустарники и лиановидные растения. Наиболее доступен в продаже **метросидерос Томаса** (Metrosideros Thomasii) - компактный кустарниковый подвид **метросидероса холмового** (Metrosideros collina) с оранжевыми или красными тычинками. Листья мягкие, серовойлочно-опушенные.

Невероятно красивы пестролистные сорта **метросидероса кермадекского** (Metrosideros kermadecensis), который еще называют кермадек поучекава (слово «поучекава» на языке новозеландского народа маори означа-



Метросидерос карминовый



Метросидерос кермадекский

ет «брызги моря»). Сорт *Вариегата* (Variegata) имеет неясное светлое окаймление листьев, а сорт *Льюис Николс* (Lewis Nicholls) - яркие желтые пятна в центре листовых пластинок. Способен к круглогодичному цветению.

Метросидерос карминовый (Metrosideros carminea) - прекрасное ампельное растение, но может расти и на опоре, цепляясь *придаточными корнями*. Красные цветки появляются в конце зимы. Есть пестролистный сорт *Карусель* (Carousel).

Метросидерос сверкающий, или **лазящий** (Metrosideros fulgens син. M. scandens), - тоже лиана, несколько мощнее предыдущей, а главное, цветет в необычные сроки - с конца лета до зимы, красными или оранжевыми цветками. Более редки желтые сорта.



Лептоспермум прутьевидный

ТОНКОСЕМЯННИК, ИЛИ ЛЕПТОСПЕРМУМ

Лептоспермум метельчатый (Leptospermum scoparium) узнаваем по мелкой сизоватой листве. Популярный сорт *Вири Джоан* (Wiri Joan) имеет розовые цветки с небольшим малиновым кольцом в центре. Очаровательно выглядят штамбовые деревца весной, покрытые многочисленными пятилепестными цветками.

Сегодня его чаще можно видеть в букетах, чем на подоконниках. Его ветки с небольшими заостренными тонкозубчатыми листьями, белыми, розовыми, сиреневыми, малиновыми или лососевыми цветками с кольцом коротких тычинок стоят долго, до 12 дней.

Лептоспермум - еще одно чайное дерево. Интересно, что первые поселенцы Австралии заваривали из его листьев ароматный чай, спасавший их от цинги в длительных путешествиях.



Лептоспермум метельчатый



Восковник крючковатый

ХАМЕЛАЦИУМ, ВОСКОВНИК, ИЛИ ВОСКОВОЙ МИРТ

Хамелациумы очень похожи на тонкосемянники строением цветков, но они несколько мельче, имеют более мясистые лепестки и тычиночные *нити*. А *игольчатые листья* делают побеги похожими на хвойные.

В продаже встречается преимущественно **восковник крючковатый** (Chamaelaucium uncinatum), сформированный на штамбе. Он назван так за загнутые на концах линейные листья. Это растение известно также под названием восковник Джералдтона - в соответствии с названием города на западе Австралии, откуда он предположительно происходит. Как бы восковые цветки природных форм зеленоватые, белые или розовые, сорта обычно более насыщенных окрасок - пурпурной, фиолетовой. Существует пышно цвету-

щий сорт *Дансинг Куин* (Dancing Queen) с махровыми, похожими на розочки цветками нежной сиренево-розовой окраски. Цветение - с весны до середины лета. Листва обладает ароматом миндаля и лимона.

Это тоже популярное срезочное растение, в продажу поступает в осенне-зимний период.





Восковник



Триптомена горная

ТРИПТОМЕНА

Триптомены - горные растения Западной Австралии небольших размеров, не выше 1-1,5 м. В продаже можно встретить сформированную на штамбе **триптомену горную** (Thryptomene saxicola). Она цветет белыми, розовыми или светло-лиловыми цветками, напоминающими лептоспермум и хамелациум, но намного мельче. На мелкие размеры цветков указывает и само название (от греческого «маленький»). Есть сорта с окраской разной степени насыщенности.

В комнатной культуре встречается и другой интересный вид - **триптомена чашевидная** (Thryptomene calycina), известная как грампианский восковой мирт (Грампианс - горная цепь в Австралии). Чашевидная немного крупнее горной, в период цветения красноватые побеги сплошь покрыты необычными цветками из 10 лепестков, расположенными в 2 ряда, постепенно меняющими цвет от белого до нежно-розового. В срезке могут стоять несколько недель.

Небольшие обратно-яйцевидные листья обоих видов обладают характерным для миртовых запахом при растирании.

ПСИДИУМ, ИЛИ ГУАВА

Этот род в первую очередь известен плодами гуайявы, точнее - **псидиума гуайявы,** или **гуавы обыкновенной** (Psidium guajava), которые продаются в теплых странах. Но и в комнатных условиях можно получить от него эти вкусные и полезные плоды.

И все же любители комнатных растений чаще отдают предпочтение другому виду - **псидиуму** или **гуаве Кеттли** (Psidium cattleianum) родом из Бразилии. Даже небольших размеров растения легко образуют твердоватые, но вкусные ароматные плоды размером с крупный грецкий орех. Имеется две разновидности растения - с более крупными плодами желто-зеленого цвета и нотками лимона в аромате (лимонная гуава) и с плодами пурпурного цвета с изумительным привкусом земляники (земляничная гуава). Декоративна и густая и плотная листва растения.



Псидиум Кеттли, взрослое растение



Псидиум Кеттли земляничный



Псидиум Кеттли лимонный

СВЕТ ВМЕСТО ХОЛОДА

До недавнего времени довольно широкий ассортимент миртовых растений поступал к нам из Израиля или через голландские аукционы, также большой выбор семян предлагают различные интернет-магазины. Многие виды есть в коллекциях ботанических садов, питомников, цветоводов-любителей.

ПРИ ПОКУПКЕ внимательно осмотрите растение - довольно часто миртовые бывают поражены мучнистым червецом, щитовкой и белокрылкой. Листья растения должны быть яркими, блестящими (исключение составляют метросидеросы и некоторые другие виды с опушенными листьями), с хорошим тургором, без коричневых пятен. Листья не должны осыпаться при встряхивании растения, при видимом листопаде или слое листьев на грунте воздержитесь от покупки. Не стоит брать растения с тусклыми листьями, у лептоспермумов сероватый цвет листьев и отсутствие блеска служат признаком серьезных проблем. Не покупайте пересушенные растения.

Для начинающих можно посоветовать различные сорта мирта обыкновенного, за исключением пестролистного сорта с мелкими листьями, который более прихотлив к условиям содержания, а также сизигиум метельчатый - одно из самых простых, красивых, компактных и легко цветущих и плодоносящих миртовых растений. Опытным цветоводам под силу будут и остальные миртовые. Осмотрительно надо отнестись к приобретению лептоспермума и бакхузии (лимонного мирта) - даже прожив несколько лет в вашем доме, растения могут буквально за 1-2 дня погибнуть без видимых причин.

Все миртовые растения светолюбивы, требуют регулярного полива круглый год и зимнего прохладного содержания. Оптимально содержать все миртовые растения круглогодично в непромерзающей светлой остекленной лоджии. Молодые экземпляры могут обойтись 1-2 года без прохладных зимовок с дополнительным светом. Большинство миртовых при соблюдении этих условий прекрасно растет, цветет и плодоносит в домашних условиях.

ОСВЕЩЕНИЕ. Предпочтительно предоставить растениям самые светлые окна южной, восточной или западной ориентации, желательно прямое солнце не меньше 4-5 ч в сутки. Но приучать растение к солнечным лучам следует постепенно и обязательно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы листья не перегревались через стекло. Необходимо также защитить темные пластиковые горшки от нагрева, чтобы не обжечь вышедшие к их стенкам корни. Особенно важен яркий свет для плодоносящих (псидиумы, евгении, сизигиумы) и красивоцветущих видов (метросидеросы, каллистемоны), при недостатке света цветение и плодоношение отсутствуют. Весной, когда минует опасность возвратных заморозков, растения можно выносить на открытый воздух, размещая их вначале под легкой тенью деревьев.

Зимой желательно досвечивать растения светодиодными либо люминесцентными лампами (идеально - специальными фитолампами). При теплом содержании молодых экземпляров подсветка просто обязательна. Лампы размещают непосредственно над растениями и дают свет по 12 ч в день с обязательным темным периодом в ночное время. Особое внимание нужно уделить лептоспермуму - даже кратковременная нехватка освещения может вызвать его быструю гибель.

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ И ЗИМОВКА. В летнее время оптимальная температура содержания составляет 20-25^0. Миртовые не любят сильной жары, хотя многие виды выносят и повышение температуры до 35-40^0. Плохо переносят жару фейхоа и хамелациум. При высоких температурах растения могут остановиться в росте, частично пожелтеть. В жаркий период необходимо увеличить влажность воздуха (опрыскивать кипяченой водой) и обеспечить хорошую вентиляцию.

Температура содержания влияет на скорость метаболизма растения: чем она выше, тем активнее протекают жизненные процессы и тем больше растение затрачивает энергии. Понижение температуры уменьшает уровень метаболизма, что позволяет пережить темные зимние месяцы. Чем теплее помещение зимой, тем ярче должен быть свет, при недостатке света растение истощается и может погибнуть.

Для зимовки всех миртовых подойдет утепленная непромерзающая лоджия (температура около 12-18^0, но не ниже 10^0). Некоторые виды перезимуют и при более низких температурах, однако весной будут дольше просыпаться и летом могут отставать в росте. Мирты могут зимовать и при более низкой температуре, около 5-10^0. При отсутствии такой лоджии можно отгородить подоконник от комнаты третьей рамой или пленкой, и там установится более низкая температура.

Молодые растения первые 1-2 года хорошо зимуют под ярким искусственным светом при комнатной температуре. Небольшие мирты могут стоять на светлых подоконниках вблизи открывающегося окна, они не боятся холодных сквозняков. Но при сильных морозах, чтобы уберечь листья, необходимо защитить растения от морозного воздуха. И одновременно с этим миртовым растениям круглогодично требуется хороший приток свежего воздуха.

ПОЛИВ. Некоторые виды, такие как мелалеуки и псидиумы, во взрослом состоянии могут пережить кратковременное

ВРЕДИТЕЛИ И БОЛЕЗНИ

Вне зависимости от условий содержания миртовые растения подвержены поражению мучнистым червецом и щитовками, а некоторые виды (мирты, мелалеуки, каллистемоны) - белокрылкой. И все без исключения уязвимы для тли.

Поскольку мирты требуют постоянной влажности грунта, в нем могут заводиться грибные комарики, которые, однако, не являются вредителями. От тли и грибных комариков достаточно 1-2 обработок инсектицидом Актара - опрыскивать крону раствором 4 г/5 л и пролить грунт в концентрации 1 г/10 л. В борьбе с мучнистым червецом и щитовкой потребуется минимум 4 обработки Актарой с интервалом неделя до полного уничтожения вредителя.

При неблагоприятных условиях содержания (нехватка света, слишком высокая температура зимой, сухой воздух, недостаточный полив, плохая вентиляция, перегрев листьев и корней) миртовые подвержены сильному поражению паутинным клещом. В этом случае необходимо устроить растению теплый душ, при сильном поражении обработать акарицидами и обязательно оптимизировать условия содержания.

В прохладных условиях при повышенной влажности на листьях миртовых растений может образоваться налет сажистого гриба - он не является патогенным, и достаточно просто протереть или вымыть листья.

Коричневые пятна на листьях могут свидетельствовать о проблемах с корнями. Если это происходит из-за залива, сократите полив, давайте верхнему слою просыхать. Часто такие проблемы обусловлены неправильно подобранным размером горшка - при излишке грунта, когда корни не полностью освоили объем, происходит переувлажнение. Реже сухие кончики появляются от недостаточного полива, от слишком тесного горшка, когда растение быстро в течение дня поглощает влагу из грунта и пересыхает. В этом случае необходимо срочно перевалить растение в больший горшок.

подсушивание, но этим лучше не злоупотреблять. А вот лептоспермуму будет достаточно одной пересушки земляного кома, чтобы он погиб.

Для всех миртовых можно рекомендовать регулярно поливать круглый год, делают это, как только начнет просыхать верхний слой грунта. Но оставлять воду в поддоне надолго нельзя, тонкие корни легко сгнивают при длительном застое воды. Летом, в жаркие дни, можно оставлять небольшой запас воды в поддоне, который обязательно должен «выпиваться» растением уже к вечеру. В зимнее время, особенно при понижении температуры до -10°, частоту и обильность поливов сокращают, но не позволяют высыхать грунту полностью. Температура поливочной воды должна соответствовать температуре помещения или быть на несколько градусов выше. Вода предпочтительна мягкая.

Если пересушка все же случилась и листья потеряли упругость, необходимо срочно полить растение и обильно опрыснуть крону несколько раз теплой водой до восстановления тургора.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СМЕСИ И ПЕРЕСАДКИ. В продажу миртовые растения поступают в легком торфяном субстрате, который вполне устраивает растение, поэтому при пересадке ни в коем случае не надо пытаться вычищать его из корней. Тем более что мирты плохо переносят травмы корней, которые неизбежны при замене грунта. То есть делают, в сущности, не пересадку, а аккуратную перевалку в чуть больший горшок, используя для досыпки легкие слабокислые земельные смеси на основе верхового торфа. После покупки голландского растения лучше провести перевалку в течение нескольких первых дней, поскольку корни плотно оплетают ком и большое их количество располагается непосредственно у стенок горшка, что может создать трудности с поливом и привести к перегреву корней.

В небольшие горшки необязательно выкладывать на дно слой дренажа, гораздо важнее добавить дренирующий материал (перлит) в субстрат. Молодые растения переваливают каждый год весной, иногда при активном росте требуется еще одна дополнительная перевалка летом. Взрослые экземпляры переселяют в более просторную емкость раз в несколько лет или просто ограничиваются заменой верхнего слоя грунта.

По мере роста в добавляемый грунт можно подмешивать все большую долю дерновой земли. При пересадке черенков и сеянцев надо ориентироваться на размер их корневой системы, не спешить переваливать, если корни еще небольшие.

ПОДКОРМКИ проводят только в весенне-летнее время универсальными комплексными удобрениями с микроэлементами небольшими дозами: разделите недельную норму на 7-10 частей и вносите по одной с каждодневным поливом. В такой же дозировке полезны будут внекорневые подкормки опрыскиванием раз в неделю.

При возникновении хлороза растения обрабатывают хелатом железа (или Феровитом). С большой аккуратностью проводят подкормки окорененных черенков и молодых сеянцев.

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА для миртовых растений требуется повышенная, при температуре воздуха в помещении выше 18° желательно опрыскивать их несколько раз в день. Особенно важно поддержание высокой влажности воздуха во время жары одновременно с хорошей циркуляцией воздуха. При прохладном содержании опрыскивания не нужны.

ОБРЕЗКА И ФОРМИРОВКА. Для удержания растений в компактном виде и придания кроне густоты регулярно проводят обрезку или прищипку растений. У многих видов цветение происходит на молодых приростах весной или в начале лета, у отдельных видов - несколько раз в год, поэтому обрезку стоит проводить в середине лете или после окончания цветения, тогда последующее цветение не пострадает.

РАЗМНОЖАЕМ САМИ



Семенами. В настоящее время цветочные и интернет-магазины предлагают широкий выбор семян миртовых растений. При их покупке обязательно обращайте внимание на срок годности. У видов, которые после цветения образуют твердые коробочки с мелкими семенами (мелалеуки, каллистемоны), всхожесть семян может сохраняться несколько лет. У видов с мягкими плодами (евгений, псидиумов, сизигиумов, фейхоа) семена, взятые непосредственно из плодов, прорастают хорошо и дружно, а при хранении вне плода быстро теряют всхожесть.

Мелкие семена высеваются непосредственно на поверхность грунта, более крупные присыпают тонким слоем рыхлого субстрата. Время прорастания у разных видов может колебаться от нескольких дней до нескольких месяцев. Грунт на основе верхового торфа для проращивания семян обязательно стерилизуется, обрабатывается фунгицидами, поскольку молодые проростки легко подвержены грибным заболеваниям. Перед посевом можно обработать семена Эпином, но особых методов предпосевной обработки они не требуют. Проращивают семена в условиях теплички с регулярным проветриванием и аккуратным смачиванием поверхности грунта, в теплом месте. У некоторых видов семена полиэмбрионные (например, у сизигиума ямбоз) - из одного семени образуется несколько проростков.

Цветение и плодоношение сеянцев у разных видов наступает в разное время, мирт способен зацвести уже в первый год, мелалеуки - на следующий год, псидиумы и сизигиумы обычно зацветают на 3-4-й год. Но в условиях комнатного выращивания сроки цветения могут наступить позже.

Черенками. При таком способе полностью сохраняются признаки материнского растения, а цветение и плодоношение наступают раньше.

Оптимальное время для взятия черенков - сразу после окончания цветения или во время приостановки роста осенью. Закончившие цветение ветки находятся на нужной стадии роста, хорошо вызрели. И обрезка в это время не лишает следующего цветения, которое происходит на молодых приростах. Нельзя брать для черенкования активно растущие и неодревеснevшие побеги - они легко сгнивают во время окоренения. Самые лучшие черенки получаются с молодых веток, когда срез приходится на полуодревеснevшую часть.

У миртов, мелалеук, каллистемонов черенки можно брать практически круглый год, они хорошо окореняются в смеси стерильного торфяного субстрата и перлита. Черенки люмы, метросидеросов, псидиумов, сизигиумов и евгений более успешно окореняются в декабре, когда приостанавливается рост и происходит вызревание побегов, для их окоренения лучше использовать торфяные таблетки диаметром 2-4 см. Однако такая поздняя обрезка у некоторых видов может навредить цветению весной.

Окоренение проходит в условиях теплички с нижним подогревом и использованием стимуляторов корнеобразования. На образование корней уходит от 10 дней до месяца, у некоторых видов - до нескольких месяцев. Не стоит пробовать окоренить черенки с недавно приобретенного голландского растения, следует дать время на выведение различных стимуляторов, которыми их обильно обрабатывали при выращивании.